



Prevalencia de edentulismo en pacientes que asisten a las clínicas de odontología de la UNICA (2012-2014)

*Alejandra Narváez P., Salvador Carrillo T.,
Rosa Reyes, Indira Patiño.*

Resumen:

Este estudio consiste en la revisión de los expedientes clínicos de todos los pacientes que asistieron a las clínicas los cuales forman parte del programa académica de los estudiantes de Odontología. Estos expedientes fueron evaluados aplicando una ficha de recolección de datos que recogió la información de pacientes que presentaron edentulismo (cantidades de piezas dentales ausentes, en diferentes categorías). Para conocer la magnitud del problema estudiado el comportamiento del edentulismo en este grupo de pacientes.

Palabras Claves: Evaluación, edentulismo, prevalencia.

Abstract:

This study involves the medical records of all patients attending clinics of Dentistry academic program. This records were evaluated by applying a form of data collection for those patients with Edentulism (amounts of missing teeth, at different categories) in order to determine the magnitude of the problem in this group of patients.

Key words: Edentulism, prevalence of dental problems.

Introducción

Este trabajo hace referencia a experiencias de tres años de trabajo con pacientes atendidos en las clínicas de odontologías de la UNICA. Por medio de un análisis documental, de los registros clínicos, se han extraído importantes resultados los cuales se comparten en por medio de este artículo. El trabajo está centrado en un problema que se presenta en un porcentaje significativo en la vida de las personas, llamado edentulismo.

¿Qué es edentulismo? Es la pérdida de dientes, parcial o total. La causa de este mal puede ser congénita o adquirida. Los edentulismos

congénitos totales son una manifestación de los síndromes congénitos muy graves, generalmente no compatibles con la vida. Sin embargo, la ausencia congénita de alguna pieza dental es más habitual. El edentulismo adquirido, es decir la pérdida de dientes durante nuestra vida, es un hecho más común que el edentulismo congénito. Suele ser secundario a procesos como caries dental, patología periodontal o traumatismos.

Una hipótesis provisional podría indicar que el 40% de la población tiene ausencia parcial o total de piezas dentales (edentulismo parcial o total) debido múltiple factores. Entre estos está, la insuficiente higiene bucal, enfermedades como caries dental y enfermedad periodontal. El objetivo

* Docentes, Facultad de Odontología, Universidad Católica Redemptoris Mater (UNICA)

del breve estudio que presentamos, consiste en determinar la prevalencia de edentulismo en la población de pacientes que asisten a las clínicas de Odontología de la UNICA, dando a conocer, el porcentaje de edentulismo parcial y total.

Material y método

Se realizó una revisión documental de los expedientes clínicos de 3 años del 2012 al 2014. Esta revisión se efectuó en Febrero de 2015. Fueron parte de este estudio los pacientes que asistieron a demandar los diferentes tipos de servicios que ofrecen los estudiantes de acuerdo a las asignaturas ofertadas en los tres años en las clínicas de Odontología.

La información recopilada fue tipo de edentulismo parcial o total. Esta información se recolectó en un formato previamente preparado para los datos del expediente clínico, para que luego se registraran en Microsoft Office Excell.

Resultados

Se evaluaron los expedientes clínicos de todos los pacientes atendidos del 2012 al 2014, en total fueron 3,000 Mil expedientes clínicos. De estos Tres Mil, 1,131 (38%) expedientes presentaron edentulismo (cantidades de ausencias de piezas dentales, en diferentes categorías) 1,869 (62%) expedientes no presentaron edentulismo, es decir, presentaron sus piezas dentales correspondientes. De 1131, 90 pacientes (3%) del grupo de estudio reflejaron ausencia total de sus piezas dentales, es decir, que necesitaban el tratamiento de las prostodoncia total, esta prótesis total es la famosa chapa 252(8%) pacientes reflejaron la ausencia de por lo menos una pieza dental, sea anterior o posterior con respecto a la ubicación en la arcada dentaria de la cavidad bucal.

Conclusión

Estos resultados demuestran, mediante la aplicación del método científico, la alta prevalencia de edentulismo en el paciente que asisten a las clínicas en la UNICA y son coherentes con los indicadores internacionales de que un 40% de la población en general es afectada por el edentulismo. El resultado en nuestro estudio nos sirve para la planeación de acciones y así desarrollar estrategias que den repuesta a esta problemática, como parte de la responsabilidad social universitaria. Palabras clave: edentulismo, prevalencia.

Referencias

- Bernal Arciniega, R. (2003) Prostodoncia parcial removible. México: Editorial Trillas.
- Bernal Arciniegas. R. (2003). Prótesis total. México: Editorial Amolca.
- Cadafalch Gabriel, E. (1997). Manual clínico de prótesis fija. Completar ciudad o país de edición: Editorial Hartcourt brace.
- Loz, f. D. (1997) Prostodoncia parcial removible. Caracas: Actualidades medico odontológica latinoamericana.
- Rendón Yudice, R. (2004) Prótesis parcial removible. México: Editorial médica panamericana.
- Poner autor. (2003) Prostodoncia total. México: Editorial Limusa.

Agradecimientos

A nuestros estudiantes de odontología y a nuestros docentes de Odontología.